



Compito CFSMG 2020

versione 2.5 con correttore

Per aggiornamenti seguici su Facebook

<https://www.facebook.com/groups/294182897859198/>

1. La diagnosi di blocco AV di I grado si pone quando l'intervallo PR è maggiore o uguale a:

- a. 160 msec
- b. 180 msec
- c. 200 msec
- d. **220 msec**
- e. 240 msec

2. Quale tra le seguenti è la manifestazione più frequente della neoplasia dell'apparato urinario?

- a. **Macroematuria**
- b. Stranguria
- c. Pollachiuria
- d. Proteinuria
- e. Disuria

3. Quale tra le seguenti affermazioni inerenti la colica biliare non è esatta?

- a. Il dolore insorge spesso un'ora dopo un pasto abbondante o ricco di grassi
- b. Il dolore è riferito all'ipocondrio dx o all'epigastrio
- c. Il dolore si può irradiare posteriormente o alla spalla
- d. Il dolore dura almeno 15-30 minuti
- e. **Il dolore non è generalmente ben controllabile con gli analgesici**

4. Il Linezolid è indicato soprattutto per il trattamento di:

- a. **Infezioni da germi Gram +, incluso Stafilocco aureo meticillino-resistente**
- b. Infezioni da miceti
- c. Infezioni da germi Gram +, escluso Stafilocco aureo meticillino-resistente
- d. Infezioni da germi Gram -, incluso Pseudomonas Aeruginosa
- e. Infezioni da germi Gram -, escluso Pseudomonas Aeruginosa

5. Nei pazienti affetti da insufficienza renale cronica l'utilizzo di quali farmaci può ridurre la progressione della malattia?

- a. **ACE-inibitori/sartani**
- b. Beta-bloccanti
- c. Diuretici risparmiatori di potassio

- d. Cortisonici a basse dosi
- e. Antibiotici

6. Quali tra le seguenti caratteristiche non compete al quadro di Acute Kidney Injury (AKI) pre-renale?

- a. Può comparire nell'arco di poche ore
- b. Non è caratterizzato, almeno inizialmente, da alterazioni strutturali a carico del parenchima renale
- c. Sul piano fisiopatologico è caratterizzato da una ridotta perfusione renale
- d. **Può essere causato da sostanze tossiche esogene (per es. antibiotici aminoglicosidi) o endogene (per es. mioglobina)**
- e. E' potenzialmente reversibile

7. Quale dei seguenti farmaci induce con maggiore frequenza un danno miocardico?

- a. Vincristina
- b. Metotrexate
- c. 5-Fluorouracile
- d. Tamoxifene
- e. **Adriamicina**

8. In quale di queste condizioni si ha il segno di Romberg positivo ad occhi sia chiusi sia aperti?

- a. Adiadococinesia
- b. Strabismo
- c. **Atassia cerebellare**
- d. Atassia tabetica
- e. Polineurite

9. La ragade anale può essere la prima manifestazione di quale delle seguenti patologie?

- a. Morbo celiaco
- b. Colite ischemica
- c. **Morbo di Crohn**
- d. Linfoma intestinale
- e. Cancro gastrico

10. Quale tra questi farmaci può essere impiegato nel trattamento dell'iperuricemia?

- a. Vildagliptin
- b. **Febuxostat**
- c. Ramipril
- d. Clopidogrel
- e. Liraglutide

11. L'assunzione importante e prolungata di liquirizia può essere causa di:

- a. **Ipopotassiemia**
- b. Ittero
- c. Ematuria
- d. Epilessia
- e. Ipercolesterolemia

12. Nel follow-up del paziente diabetico quale dei seguenti esami strumentali non trova indicazione ai fini della prevenzione delle complicanze?

- a. Ecocardiogramma
- b. Monitoraggio pressorio delle 24h
- c. Test ergometrico
- d. ECG
- e. **EEG**

13. Una donna di 77 anni, che presenta in anamnesi ipertensione arteriosa e dislipidemia, che punteggio avrà nel calcolo del CHA2DS2-VASc?

- a. 2
- b. **4**
- c. 3
- d. 5
- e. 1

14. Le seguenti condizioni possono determinare un aumento del NT-pro BNP, ad eccezione di una. Quale?

- a. Embolia polmonare
- b. Scompenso cardiaco
- c. Età avanzata
- d. **Obesità**
- e. Cirrosi epatica

15. Quale tra le seguenti indagini eviteresti in un paziente con un quadro di epatite acuta?

- a. Anticorpi anti-HAV IgM
- b. HBsAg
- c. HEV-RNA
- d. **Anticorpi anti-transglutaminasi**
- e. Anticorpi anti-nucleo

16. La sindrome da carcinoide presenta:

- a. Aumentata escrezione di acido fenilpiruvico
- b. Aumentata escrezione di acido vanil-mandelico
- c. **Aumentata escrezione di acido 5-idrossiindolacetico**
- d. Aumentata escrezione di tutti e tre i metaboliti su indicati
- e. Diminuita escrezione di tutti e tre i metaboliti su indicati

17. Tutte le seguenti patologie possono determinare osteoporosi nella donna, tranne una. Quale?

- a. Menopausa precoce spontanea
- b. Amenorrea secondaria
- c. **Policistosi ovarica**
- d. Menopausa chirurgica con annessiectomia
- e. Distiroidismi

18. L'acidosi respiratoria è caratterizzata da:

- a. Aumento dell'acido lattico e riduzione dei bicarbonati
- b. **Aumento della pCO₂ e riduzione del pH**
- c. Riduzione della pCO₂ e riduzione del pH
- d. Aumento della pCO₂ e aumento del pH
- e. Aumento della pCO₂ e riduzione dei bicarbonati

19. La pancreatite acuta tende ad insorgere con maggior frequenza nei soggetti:

- a. Al di sotto dei 45 anni
- b. Al di sotto dei 30 anni
- c. Con intolleranza al lattosio
- d. **Con colelitiasi**
- e. Affetti da morbo di Crohn

20. Nel digiuno protratto si rileva:

- a. **Chetonemia**
- b. Iperprotidemia
- c. Iperbicarbonatemia
- d. Ipervolemia
- e. Tendenza all'acidosi

21. In corso di crisi tireotossica può essere presente:

- a. Bradicardia
- b. Stipsi
- c. Intolleranza al freddo
- d. **Ipertermia**
- e. Anidrosi

22. L'esposizione a vernici e coloranti è associata con maggiore frequenza a:

- a. Cancro della pelle
- b. **Cancro della vescica**
- c. Cancro del polmone
- d. Cancro della laringe
- e. Cancro del fegato

23. Quale beta-bloccante si utilizza abitualmente nel controllo dell'iper-attivazione simpatica in corso di ipertiroidismo?

- a. Bisoprololo
- b. Carvedilolo
- c. **Propranololo**
- d. Metoprololo
- e. Atenololo

24. La colorazione gialla della cute, in assenza di colorazione gialla delle sclere, è dovuta ad eccesso di:

- a. **Carotene**
- b. Melanina
- c. Bilirubina
- d. Emoglobina ossidata
- e. Sulfemoglobina

25. A quale genere appartiene l'agente eziologico della tubercolosi?

- a. Borrelia
- b. Bordetella
- c. Bacillus
- d. **Mycobacterium**
- e. Corynebacterium

26. Cosa caratterizza la malattia di von Willebrand?

- a. Cianosi
- b. Tempo di emorragia accorciato
- c. **Deficit funzionale delle piastrine**
- d. Iperfibrinogenemia
- e. Aumento del fattore VIII della coagulazione

27. A quale fra questi gruppi di virus appartiene quello di Epstein-Barr?

- a. Papovavirus
- b. Adenovirus
- c. **Herpes virus**
- d. Parvovirus
- e. Picornavirus

28. In quale tra le seguenti patologie non è indicato l'eco doppler dei vasi epiaortici?

- a. Claudicatio Intermittens
- b. Pregressa tromboendoarteriectomia carotidea (TEA)
- c. Diabete mellito di tipo 2
- d. Severa dislipidemia
- e. **Ipotiroidismo in tiroidite di Hashimoto**

29. Quale tra le seguenti condizioni non è tra le cause di alcalosi metabolica?

- a. Vomito persistente
- b. Terapia protratta con antiacidi
- c. Ipersecrezione di mineralcorticoidi
- d. Uso di diuretici dell'ansa o di diuretici tiazidici
- e. **Insufficienza renale acuta in fase oligurica**

30. Feci ad acqua di riso sono caratteristiche di:

- a. Colite ulcerosa
- b. **Colera**
- c. Morbo di Crohn
- d. Sprue
- e. Appendicite acuta

31. I carcinomi dell'apice polmonare possono determinare la sindrome di Bernard-Horner per:

- a. Compressione del nervo vago
- b. Parziale ostruzione della carotide omolaterale
- c. **Impegno della catena del simpatico**
- d. Ipertrofia del timo
- e. Iperostosi

32. Quale tra le seguenti manifestazioni clinico/laboratoristiche non compete al quadro

della “sindrome uremica”?

- a. Pericardite/versamento pericardico
- b. Alterazioni dello stato di coscienza fino al coma
- c. Emorragie digestive
- d. Anemia
- e. **Ipertransaminasemia**

33. La sindrome da demielinizzazione osmotica è una condizione grave e spesso irreversibile, che può insorgere a seguito di:

- a. Correzione rapida o eccessiva dell'ipernatriemia
- b. **Correzione rapida o eccessiva dell'iponatriemia**
- c. Correzione rapida o eccessiva dell'ipokaliemia
- d. Correzione non adeguata dell'iperkaliemia
- e. Correzione lenta e non adeguata dell'acidosi metabolica

34. Nel trattamento del tromboembolismo venoso, dei 4 anticoagulanti orali diretti 2 possono essere utilizzati senza un pre-trattamento con eparina a basso peso molecolare (EBPM). Quali?

- a. Dabigatran e rivaroxaban
- b. Dabigatran e apixaban
- c. **Rivaroxaban e apixaban**
- d. Rivaroxaban e edoxaban
- e. Edoxaban e dabigatran

35. Nella sindrome del tunnel carpale, il pz lamenta, in genere, dolore associato a parestesie:

- a. **Delle prime 4 dita della mano**
- b. Delle ultime 2 dita della mano
- c. Delle ultime 4 dita della mano
- d. Delle ultime 3 dita della mano
- e. Del palmo della mano, ma non delle dita

36. La natriemia di solito è normale nella:

- a. Disidratazione ipertonica
- b. Disidratazione ipotonica
- c. **Disidratazione isotonica**
- d. Iperidratazione ipertonica
- e. Iperidratazione ipotonica

37. Quale è la sindrome caratterizzata da difettosa coniugazione della bilirubina?

- a. Dubin-Johnson
- b. Mallory-Weiss
- c. **Gilbert**
- d. Israel
- e. Peutz-Jeghers

38. Quale tra le seguenti caratteristiche non è propria del dolore da ischemia miocardica?

- a. È in genere graduale all'inizio
- b. È generalmente provocato dall'esercizio fisico
- c. **Cambia con la respirazione o la posizione**
- d. Può rispondere alla nitroglicerina
- e. Si irradia spesso ad altre parti del corpo

39. Quale affermazione è vera sulla copertura vaccinale?

- a. È la quota di soggetti vaccinati sul totale della popolazione e ha una soglia di sicurezza del 95%
- b. **È la quota di soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione e ha una soglia di sicurezza del 95%**
- c. È la quota di soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione e ha una soglia di sicurezza del 90%
- d. È la quota di soggetti vaccinati sul totale dei soggetti candidati alla vaccinazione e ha una soglia di sicurezza dell'85%
- e. È la quota di soggetti vaccinati sul totale della popolazione e ha una soglia di sicurezza dell'85%

40. Quale tra le sotto indicate neoplasie presenta maggiore incidenza in età giovanile?

- a. Carcinoma dello stomaco
- b. **Sarcoma di Ewing**
- c. Carcinoma della prostata
- d. Leucemia linfatica cronica
- e. Plasmocitoma

41. Nella celiachia una di queste affermazioni è falsa. Quale?

- a. È una sindrome da malassorbimento con varie espressioni fenotipiche
- b. È un'intolleranza alimentare frequente
- c. **Non si associa a malattie autoimmuni**
- d. La presenza di anticorpi anti transglutaminasi può fare ipotizzare la diagnosi
- e. La biopsia duodenale permette di confermare la diagnosi

42. In relazione ai farmaci antidiabetici orali SGLT2-inibitors (sodio-glucosio-CO-trasporter 2 inibitori), quale affermazione non è corretta?

- a. Agiscono riducendo il riassorbimento di glucosio a livello del tubulo contorto prossimale
- b. La riduzione della glicemia è indipendente dalla secrezione di insulina
- c. I maggiori effetto collaterali sono rappresentati dalle infezioni urogenitali
- d. Inducono calo ponderale
- e. **Possono essere utilizzati in associazione con metformina ma non con insulina**

43. Quale tra le seguenti condizioni non è tra le cause di iperpotassiemia?

- a. Scompenso diabetico con iperglicemia e iperosmolarità
- b. Uso di beta-bloccanti
- c. Acidosi metabolica
- d. **Uso di diuretici dell'ansa o di diuretici tiazidici**
- e. Insufficienza renale acuta in fase oligurica

44. I sulfamidici sono:

- a. Antibiotici
- b. **Chemioterapici**
- c. Composti di origine animale
- d. Composti di origine vegetale
- e. Composti estratti dal terreno

45. Nella cirrosi epatica non colestatica non si osserva di solito:

- a. Eritema palmare
- b. Ginecomastia
- c. Ipoprolattinemia
- d. Spider nevi
- e. **Ipercolesterolemia**

46. Quale dei seguenti antipertensivi può provocare iperpotassiemia?

- a. Alfa-metildopa
- b. Calcio antagonisti
- c. **ACE-inibitori**
- d. Diuretici tiazidici
- e. Alfa-bloccanti

47. Nell'iter diagnostico della sindrome di Cushing centrale, la somministrazione di desametasone ad alto dosaggio determina:

- a. Aumento dei valori di ACTH
- b. Aumento dei valori di cortisolemia
- c. Aumento di ACTH e cortisolemia
- d. **Diminuzione dei livelli di cortisolemia**
- e. Aumento di ACTH e diminuzione della cortisolemia

48. La composizione più frequente dei calcoli delle vie urinarie è rappresentata da:

- a. **Ossalato di calcio**
- b. Fosfato di calcio
- c. Bilirubinato di calcio
- d. Fosfato ammonio magnesiaco
- e. Acido urico

49. Quale di queste affermazioni relative alla mielofibrosi è errata?

- a. È una malattia rara
- b. È un disordine mieloproliferativo
- c. Può essere l'evoluzione della policitemia vera
- d. **È la complicanza più frequente del linfoma non Hodgkin**
- e. Frequentemente è presente la mutazione Jak2

50. Qual è il valore soglia di HbA1c per porre diagnosi di diabete mellito?

- a. > 8.0%
- b. >8.5%
- c. >6.0%
- d. **>6.5%**
- e. >7.0%

51. Quale delle seguenti neoplasie pancreatiche ha la prognosi peggiore?

- a. Cistoadenoma mucinoso
- b. Cistoadenocarcinoma mucinoso
- c. **Adenocarcinoma duttale**
- d. Insulinoma maligno
- e. Tumore neuroendocrino maligno non secernente

52. In quale delle seguenti condizioni è meno probabile l'insorgenza della fibrillazione atriale?

- a. Ipertensione arteriosa
- b. Cardiopatia ischemica
- c. Valvulopatie e/o cardiomiopatie
- d. **Ipotiroidismo**
- e. Età avanzata

53. Il sovra-slivellamento del tratto ST-T nelle derivazioni D2, D3, aVF consente di porre diagnosi di infarto miocardico in sede:

- a. **Inferiore**
- b. Laterale
- c. Anteriore
- d. Antero-laterale
- e. Settale

54. L'amiloidosi renale è una complicanza frequente dei pazienti che effettuano sedute dialitiche da molti anni. Quale forma di amiloidosi è caratteristica in questi pazienti?

- a. AA
- b. **B2-microglobulina**
- c. AL
- d. ATTR
- e. AMed

55. Quale dei seguenti diuretici non useresti nel trattamento dell'ascite in corso di cirrosi?

- a. Spironolattone
- b. Canrenone
- c. Furosemide
- d. Torasemide
- e. **Metolazone**

56. L'insufficienza renale acuta da necrosi della papilla renale si verifica con maggiore frequenza:

- a. Nell'ipertiroidismo
- b. Nella tubercolosi renale
- c. Nel morbo di Addison
- d. **Nel diabete mellito**
- e. Nella malattia di Cushing

57. Il quadro laboratoristico di un iperparatiroidismo primitivo si caratterizza per:

- a. Ipocalcemia, iperfosforemia, PTH normale
- b. Ipercalcemia, iperfosforemia, PTH aumentato
- c. **Ipercalcemia, ipofosforemia, PTH aumentato**

- d. Ipocalcemia, ipofosforemia, PTH aumentato
- e. Ipocalcemia, ipofosforemia, PTH diminuito

58. L'anemia da carenza di acido folico presenta le seguenti caratteristiche:

- a. **Macrocitica, ipercromica**
- b. Macrocitica, ipocromica
- c. Microcitica, ipercromica
- d. Microcitica, ipocromica
- e. Normocitica, normocromica

59. In quale delle sottoindicate condizioni si rileva polso celere?

- a. Ipovolemia
- b. Infarto del miocardio
- c. Shock
- d. Pericardite costrittiva
- e. **Tireotossicosi**

60. Non è causa di ostruzione delle vie aeree in soggetti asmatici:

- a. La pollinosi
- b. La virosi respiratoria
- c. L'esposizione all'aria fredda
- d. **Il solfato di magnesio**
- e. L'esercizio fisico

61. A quale gruppo di sostanze chimiche appartiene la penicillina?

- a. Glicidi
- b. Glicoproteine
- c. Lipoproteine
- d. **Betalattamici**
- e. Polisaccaridi

62. Quale tra le seguenti indagini non è utile per l'inquadramento diagnostico nel sospetto di una pancreatite acuta?

- a. Amilasemia pancreatica e lipasemia
- b. Trigliceridemia
- c. **Colesterolemia**
- d. Calcemia
- e. Ecografia addome superiore

63. Quale dei seguenti vaccini contiene virus vivi e attenuati?

- a. Anti-epatite B
- b. Anti-tetano
- c. Anti-influenza
- d. **Anti-morbillo**
- e. Anti-rabbia

64. Il CA 15.3 è un marker tumorale utilizzato per:

- a. Lo screening del cancro del colon
- b. Lo screening del cancro della mammella
- c. Lo screening del cancro della prostata
- d. **Il monitoraggio post operatorio del cancro della mammella**

e. Il monitoraggio post operatorio del cancro della tiroide

65. L'anemia sideropenica ha le seguenti caratteristiche:

- a. **Microcitica, ipocromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia ridotta.**
- b. Microcitica, ipercromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia ridotta.
- c. Microcitica, ipocromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia aumentata.
- d. Macrocitica, ipercromica, saturazione transferrinica ridotta e ferritinemia ridotta.
- e. Microcitica, ipocromica, saturazione transferrinica aumentata e ferritinemia ridotta.

66. Quale tra le seguenti affermazioni relative alla sclerosi multipla non è esatta?

- a. Esordisce generalmente in giovane età
- b. Il sesso femminile è più colpito del sesso maschile
- c. È una malattia autoimmune cronica demielinizzante del sistema nervoso centrale e del midollo
- d. Esordisce spesso con disturbi del visus
- e. **Porta sempre alla disabilità fisica e intellettiva**

67. Tutte le seguenti sono causa di ginecomastia tranne una. Quale?

- a. Uso di antialdosteronici
- b. Cirrosi epatica
- c. **Sindrome di Turner**
- d. Carcinoma testicolare
- e. Tumore delle cellule di Leydig del testicolo

68. Cosa rappresenta la capacità polmonare totale (TLC)?

- a. Il volume di gas contenuto nei polmoni dopo un'espiazione massima
- b. **Il volume di gas contenuto nei polmoni dopo un'inspirazione massima**
- c. Il volume di gas contenuto nei polmoni misurato a riposo
- d. Il volume di gas contenuto nei polmoni, misurato dopo l'esercizio fisico
- e. Il volume di gas contenuto nei polmoni in un paziente con enfisema dopo espiazione

69. Gli immunocomplessi antigene-anticorpo si depositano più facilmente:

- a. Nella mucosa gastrica
- b. Nella vescica
- c. Nei linfonodi
- d. **Nel glomerulo renale**
- e. Nella milza

70. Quale tra i seguenti antibiotici è il più indicato per la profilassi della peritonite batterica spontanea nel paziente con cirrosi ed ascite?

- a. Neomicina
- b. Paramomicina
- c. Co-trimossazolo
- d. **Norfloxacin**
- e. Vancomicina

71. Quale tra le seguenti affermazioni sul tremore essenziale è errata?

- a. Non ha eziologia nota
- b. Fattori predisponenti possono essere genetici e/o ambientali
- c. Si manifesta prevalentemente agli arti superiori
- d. Si aggrava in condizioni di stress
- e. **Non si associa mai a decadimento cognitivo e/o parkinsonismo**

72. Quale dei seguenti non rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di diabete mellito di tipo 2?

- a. Obesità
- b. **Malattia autoimmune**
- c. Ipertensione arteriosa
- d. Sindrome metabolica
- e. Sedentarietà

73. Quale tra le seguenti variabili cliniche e laboratoristiche non fa parte del Child-Turcotte-Pugh score (CTP score) per la valutazione prognostica del paziente con cirrosi?

- a. **Sodiemia**
- b. Attività protrombinica o INR
- c. Presenza e quantità di ascite
- d. Presenza e grado di encefalopatia
- e. Albuminemia

74. A quale gruppo sierologico appartengono gli Streptococchi responsabili di meningiti neonatali?

- a. Gruppo A
- b. **Gruppo B**
- c. Gruppo C
- d. Gruppo D
- e. Gruppo E

75. Giovane studente lamenta da alcune ore iperpiressia, cefalea ingravescente, vomito, confusione e presenta aspetto notevolmente sofferente. Il giorno precedente ha accusato intensa otalgia e febbre trattata con paracetamolo e terapia locale (antibiotico+cortisone) senza beneficio. Il possibile sospetto diagnostico è:

- a. Otomicosi
- b. Pansinusite
- c. Sindrome influenzale
- d. **Meningite**
- e. Ascesso dentario

76. La deposizione di rame nel SNC nel Morbo di Wilson interessa:

- a. Il talamo
- b. L'amigdala
- c. Il chiasma ottico
- d. **I nuclei della base**
- e. La capsula interna

77. La malattia policistica renale autosomica dominante (ADPKD) è causata, in gran parte dei casi, da mutazioni che interessano il gene:

- a. **PKD1**
- b. PKD2
- c. VHL
- d. NPHP1
- e. TSC1

78. Che tipo di inclusioni si formano nelle cellule infettate con il virus dell'herpes simplex?

- a. Corpi del Negri
- b. Granuli di Babes Ernst
- c. Granuli di Much
- d. **Corpi di Lipschutz**
- e. Corpi di Guarnieri

79. L'iperparatiroidismo può favorire l'insorgenza di:

- a. Pielonefrite
- b. Iperparatiroidismo
- c. Ipocalcemia
- d. **Calcolosi renale**
- e. Cirrosi epatica

80. Tutti i seguenti farmaci sono inibitori selettivi del re-uptake della serotonina (SSRi) tranne uno. Quale?

- a. Paroxetina
- b. Fluoxetina
- c. **Amitriptilina**
- d. Sertralina
- e. Escitalopram

81. L'effetto collaterale più grave dei tiouracili, utilizzati nell'ipertiroidismo è:

- a. Policitemia
- b. **Agranulocitosi**
- c. Piastrinopenia
- d. Incremento degli enzimi epatici
- e. Incremento degli enzimi muscolari

82. La cianosi è frequente in tutte le seguenti condizioni tranne una. Quale?

- a. Poliglobulia
- b. Embolia polmonare estesa
- c. Metaemoglobinemia
- d. **Anemia grave**
- e. Esposizione prolungata ad alta quota

83. Quale indagine permette, meglio di tutte le altre, la visualizzazione dei dotti pancreatici?

- a. Ecografia addome
- b. TAC addome
- c. RMN addome
- d. Eco-endoscopia pancreatica
- e. **ERCP (colangio-pancreatografia endoscopica retrograda)**

84. Al fenomeno "LE" (cellule specifiche del lupus eritematoso sistemico) partecipano:

- a. I basofili
- b. I linfociti t
- c. I linfociti B
- d. **I neutrofili**
- e. Le piastrine

85. In un paziente che lamenta dolore all'ipocondrio dx, nausea e febbre fino a 38° e che presenta in anamnesi calcolosi della colecisti, quale tra i seguenti esami è più opportuno eseguire in prima istanza?

- a. RX diretta addome
- b. Esofagogastroduodenoscopia
- c. **Ecografia Addome**
- d. TC Addome
- e. RMN addome

86. Quale delle seguenti positività anticorpali è la meno rilevante per la diagnosi di epatite autoimmune?

- a. **Positività degli anticorpi anti-actina**
- b. Positività di ANA
- c. Positività di ANA e di SMA
- d. Positività degli anticorpi anti-LKM
- e. Positività degli anticorpi anti-SLA

87. In una paziente con ipopotassiemia, quale alterazione elettrocardiografica è possibile riscontrare?

- a. **Onda U prominente**
- b. Onda T appuntita
- c. Onda T a tenda
- d. Onda Delta
- e. Tratto ST sopraslivellato

88. Nella malattia di Graves-Basedow sono generalmente presenti le seguenti alterazioni degli esami di laboratorio, tranne una. Quale?

- a. TSH diminuito
- b. FT4 e FT3 aumentati
- c. **VES aumentata**
- d. Anticorpi anti-TPO presenti
- e. Anticorpi anti recettore TSH presenti

89. In un paziente con decadimento cognitivo, alla comparsa di allucinazioni uditive e visive, quale categoria di farmaci risulta indicata in prima istanza?

- a. SSRI
- b. SSRI-SRNI
- c. Benzodiazepine
- d. **Antipsicotici di nuova generazione**
- e. Antipsicotici di vecchia generazione

90. Le infezioni delle vie urinarie sono per la maggior parte causate da:

- a. Stafilococco
- b. **E.Coli**

- c. Streptococco
- d. Clamidia
- e. Ureaplasma

91. L'ipotiroidismo primitivo riconosce tra le cause più frequenti:

- a. **Tiroidite di Hashimoto**
- b. Pregressi interventi sull'ipofisi
- c. Sindrome della sella vuota
- d. Danno vascolare ipofisario post-partum
- e. Neoplasie della tiroide

92. Nell'epatite fulminante possono essere presenti le seguenti manifestazioni cliniche tranne una. Quale?

- a. Insufficienza renale
- b. Diminuita sintesi del fattore V
- c. **Edema polmonare**
- d. Ipoglicemia
- e. Ittero ingravescente

93. Quale malattia non si accompagna solitamente ad inappetenza?

- a. Tubercolosi
- b. Insufficienza renale cronica avanzata
- c. **Adenoma dell'apparato insulare del pancreas**
- d. Morbo di Addison
- e. Carcinoma del pancreas

94. La più frequente neoplasia gastrica causata da Helicobacter Pylori è:

- a. Tumore gastrointestinale stromale
- b. Carcinoide
- c. Linfoma a cellule T
- d. MALToma
- e. **Adenocarcinoma**

95. La Dengue è:

- a. **E' una malattia virale acuta trasmessa da alcuni tipi di zanzara in zone endemiche**
- b. E' una malattia virale acuta trasmessa da alcuni tipi di mosca in zone endemiche
- c. E' una malattia virale acuta trasmessa dalle zecche in zone endemiche
- d. E' una malattia virale gastrointestinale trasmessa per via oro-fecale in zone endemiche
- e. E' una malattia protozoaria trasmessa dalle zecche in zone endemiche

96. Con il termine nefropatia da analgesici si identifica:

- a. **Una nefropatia caratterizzata da necrosi papillare e/o nefrite cronica interstiziale**
- b. Una glomerulonefrite cronica membranosa
- c. Una sindrome nefrosica
- d. Una glomerulonefrite cronica membrano-proliferativa
- e. Una calcolosi renale bilaterale

97. Tutte le sotto indicate condizioni possono complicarsi con un diabete di tipo 2 ad esclusione di una. Quale?

- a. **Morbo di Simmonds**
- b. Emocromatosi
- c. Acromegalia
- d. Morbo di Cushing
- e. Feocromocitoma cronico

98. Nella scelta di una terapia ipnoinducente, in particolare in un paziente attivo, sono da preferire le benzodiazepine ad emivita breve/intermedia. Quale molecola non rientra in questo gruppo?



- a. Alprazolam
- b. Triazolam
- c. Lormetazepam
- d. **Diazepam**
- e. Lorazepam

99. Le manifestazioni cliniche di un ipercortisolismo possono comprendere:

- a. Anemia, ipotensione arteriosa, ipercheratosi
- b. Iperpotassiemia, ipoglicemie, ipertensione arteriosa
- c. Alopecia, ipereosinofilia, ipomagnesemia
- d. **Iperensione arteriosa, insulino-resistenza, osteoporosi**
- e. Linfocitosi, piastrinopenia, atrofia cutanea

100. Qual è il più importante stimolatore della secrezione acida gastrica?

- a. Colecistochinina
- b. **Gastrina**
- c. Somatostatina
- d. Istamina
- e. Acetilcolina

