



RICOSTRUZIONE PROVA CONCORSO MMG 2020

Quella che segue è una prima ricostruzione del compito del concorso MMG 2020. Sono state segnate le risposte presumibilmente giuste ma senza avere la domanda completa e le risposte complete non è possibile dare con certezza la risposta corretta.

Vi invitiamo a commentare nel cercando di completare

- 1) La domanda
- 2) Le risposte mancanti
- 3) Provare a dire quale fosse quella giusta secondo voi

Un ringraziamento al team di lavoro che si è impegnato in questa prima ricostruzione.

1. Qual è il microrganismo responsabile dell'idatidosi?

- a. **echinococcus granulosus**
- b. echinococcus
- c. giardia lamblia
- d. tenia
- e. leptospira

2. Quando si definisce l'obesità?

- a. **BMI > 30**
- b. BMI > 25
- c. BMI > 27.5
- d. BMI > 19
- e.

3. L'ossiuriasi è una malattia infettiva provocata da quale microrganismo?

- a. enterobius vermicularis**
- b. tenia
- c. nocardia
- d.
- e.

4. Causa più frequente di poliuria?

- a. diabete
- b. ipertiroidismo
- c. glomerulonefrite
- d.
- e.

5. La malattia da graffio di gatto da che agente è causata?

- a. Bartonella henselae**
- b. Toxoplasma gondii
- c. Stafilococco
- d. Streptococco
- e.

6. Signora con graffio morso di gatto, già medicata, ferita non sanguinante, accede in DEA. Qual è una delle prime domande da porre?

- a. se ha eseguito regolare vaccinazione antitetanica**
- b. se fa terapia con anticoagulanti/antiaggreganti
- c. se ha avuto febbri ricorrenti
- d. se il gatto ha patologie croniche
- e.

7. Da quale batterio è data la brucellosi?

- a. protozoo
- b. gram +
- c. gram -**
- d. micete
- e. virus

8. Per quali valori si ha una IRC di grado 2?

- a. tra 89 e 60
- b. tra 29 e 15
- c. < 15
- d. tra 59 e 30
- e. > 90

9. Qual è il dosaggio massimo giornaliero di Tachipirina?

- a. 3000mg
- b. 2000 mg
- c. 6000 mg
- d.
- e.

10. La malattia di Wilson è:

- a. autosomica recessiva
- b. una malattia ematologica
- c. malattia midollo osseo
- d. malattia muscolare
- e.

11. In un pz con esofago di Barrett senza displasia, ogni quanto va eseguito il follow up?

- a. tra i 3 e 5 anni
- b. ogni 6 mesi
- c. ogni anno
- d. ogni 2 anni
- e.

12. Nell'endocardite batterica qual è il batterio più frequente?

- a. stafilococchi
- b. streptococchi
- c. enterococchi
- d.
- e.

13. Quali sono i valori di TSH da raggiungere nel pz ipotiroideo con più di 70 anni in tp con L tiroxina?

- a. 6-8
- b. 2-3**
- c. 4-6
- d. 0-2
- e.

14. Il soffio di Austin-Flint è patognomonico di:

- a. Insufficienza aortica**
- b. insufficienza mitralica
- c. stenosi aortica
- d. stenosi mitralica
- e.

15. La displasia congenita dell'anca è diagnosticabile attraverso quale manovra?

- a. La manovra di Ortolani**
- b. manovra di Lachman
- c. segno di Mingazzini
- d.
- e.

16. In antichità si identificava come paludismo:

- a. malaria**
- b. tubercolosi
- c. brucellosi
- d. toxoplasmosi
- e. lyme

17. HAS BLED

- a. aptt**
- b. drugs o alcol
- c. ipertensione
- d.
- e.

18. CHADVASC, segna la risposta corretta:

- a. I numeri 2 indicano doppio punteggio se età superiore a 75aa e se evento cardiovascolare maggiore**
- b.
- c.
- d.
- e.

19. Qual è la causa più frequente di emorragia digestiva?

- a. ulcera**
- b. neoplasie
- c.
- d.
- e.

20. Qual è l'esame gold standard per la diagnosi di COVID-19?

- a. PCR con tampone molecolare**
- b. sierologico
- c. Rx torace
- d. antigenico
- e.

21. Nella bpcO quando attuare la LTOT sulla base dei valori di EGA?

- a. pO₂ tra 55-60**
- b. 60-65
- c. pCO₂ >55
- d. SpO₂ >90
- e. >60

22. La diagnosi riacutizzazione della bpcO è prevalentemente:

- a. clinica**
- b.
- c.
- d.
- e.

23. Nell'asma moderata che classi di farmaci usare:

- a. ICS + LABA
- b. ICS + antimuscarinico
- c.
- d.
- e.

24. L'asma con due attacchi diurni nonostante tp senza risvegli notturni è:

- a. controllata
- b. non controllata
- c. parzialmente controllata
- d. grave
- e.

25. Il progetto cuore è uno score che serve a:

- a. calcolare il rischio di evento cv maggiore a 10 anni
- b. calcolare il rischio di evento cv maggiore a 5 anni
- c. il rischio di morte a 10 anni
- d.
- e.

26. Diabete e scompenso cardiaco acuto, quando si può usare la metformina?

- a. mai
- b. dipende da frazione renale
- c.
- d.
- e. **sempre**

27. Nel pz con diabete mellito e scompenso cardiaco cronico, quale ipoglicemizzante orale scegliere?

- a. **glifozine (SGLT2)**
- b. **metformina**
- c. inibitori DPP-4
- d. sulfoniluree
- e.

28. Nel pz con diabete mellito in terapia con steroidi quale ipoglicemizzante scegliere?

- a. **insulina**
- b. metformina
- c.
- d.
- e.

29. Quale dei seguenti è un fattore di rischio per il diabete da steroidi?

- a. **precedente diabete gestazionale**
- b. neoplasia
- c. scompenso cardiaco
- d. malnutrizione
- e.

30. Quale di queste affermazioni sul morbo di Osgood Schlatter è corretta?

- a. **la prognosi è quasi sempre benigna**
- b. per la diagnosi è necessaria l'artrocentesi del ginocchio
- c. **entro i 10 anni l'80% dei bambini viene/deve essere operato chirurgicamente**
- d.
- e.

31. Quale di queste non è presente nella MEN1?

- a. prolattinoma
- b. **ganglioneurinomi**
- c. iperparatiroidismo
- d. tumore pancreatico
- e. tumore ipofisario

32. Quali sono gli effetti collaterali tipici degli antipsicotici?

- a. **sintomi extrapiramidali**
- b. serotoninergici
- c. noradrenergici
- d.
- e.

33. Quale delle seguenti è più frequente nel sesso maschile?

- a. Feocromocitoma
- b. Tumore del rene**
- c. Insufficienza cardiaca**
- d. tumore al polmone
- e. Miocardite acuta

34. Qual è l'esame da eseguire per la diagnosi di certezza della celiachia?

- a. biopsia**
- b. anticorpi anti-transglutaminasi, IgA
- c. anticorpi anti-endomisio
- d. anticorpi anti-gliadina, IgA
- e.

35. Qual è la causa più frequente di infezioni crociate in struttura

- a. non lavaggio mani negli operatori**
- b. visite dei parenti
- c. impianto aerazione
- d. contatto con strumenti non invasivi (stetofonendoscopio, sfigmomanometro, ecc)**
- e.

36. Nella lussazione dell'articolazione scapolo-omerale si esegue per primo:

- a. RX**
- b. emocromo
- c. TC cranio con mdc
- d. TC cranio senza mdc
- e.

37. L'occlusione intestinale è diagnosticabile con:

- a. RX addome diretto**
- b. TC addome senza mdc
- c. TC addome con mdc
- d.
- e.

38. La terapia della sarcoidosi:

- a. **prednisone**
- b. colchicina
- c. imatinib
- d.
- e.

39. La sarcoidosi è:

- a. **una malattia infiammatoria sistemica**
- b. una malattia infettiva
- c. una neoplasia
- d.
- e.

40. Quante sono le vene surrenaliche?

- a. **due, una a sx e una a dx**
- b. due a dx e una a sx
- c. due a sx e una a dx
- d.
- e.

41. Segna l'affermazione corretta sul sistema di conduzione cardiaca:

- a. la branca sx si divide in 2, anteriore e posteriore
- b. la branca sx è unica, non si divide
- c.
- d.
- e.

42. Dopo un'emorragia massiva si ha uno shock di tipo:

- a. **ipovolemico**
- b. cardiogeno
- c.
- d.
- e.

43. Il BAV di tipo 2 è un'aritmia di tipo:

- a. ipercinetica
- b. Ipocinetica**
- c. sopraventricolare
- d. ventricolare
- e. sincronizzata

44. Entro quando è più probabile che un pz con ictus sviluppi una TVP?

- a. un mese
- b. 10 giorni**
- c. 45 giorni
- d. 3 mesi**
- e.

45. Cosa non funziona per il trattamento dell'esoftalmo nell'oftalmopatia basedowiana?

- a. glucocorticoidi
- b. chirurgia
- c. glucocorticoidi E chirurgia
- d. radioterapia
- e. Beta-bloccanti**

46. Cosa dai in caso di tempesta tiroidea:

- a. metimazolo + b bloccanti,**
- b. 5propitiuracile + prapoanololo,
- c. glucocorticoidi
- d.
- e.

47. L'osteoporosi non aumenta se:

- a. esercizio fisico moderato
- b.
- c.
- d.
- e.

48. In quale non indaghi la celiachia?

- a. Ipertensione resistente**
- b. Diarrea
- c. Aborti
- d. menopausa precoce
- e.

49. Qual è la terapia per l'IPB?

- a. alfa litici + inibitori alfa reduttasi**
- b.
- c.
- d.
- e.

50. Quanto deve durare la triplice terapia per l'eradicazione dell'HP?

- a. 14 giorni**
- b. 20 giorni
- c. 10 giorni
- d. 7 giorni
- e.

51. Qual è la causa più frequente di dolore toracico?

- a. pneumotorace
- b. angina pectoris**
- c.
- d.
- e.

52. Cos'è la malattia di moschowitz?

- a. piastrinopenia**
- b.
- c.
- d.
- e.

53. Nella peritonite batterica spontanea:

- a. la flora è mista
- b. la flora è prevalentemente gram negativi
- c. bisogna impostare la terapia solo sulla base di antibiogramma
- d. la diagnosi si fa se ci sono Più di 250 neutrofili su liquido ascitico**
- e. la flora è prevalentemente gram positivi

54. Nella sindrome nefrosica cosa non è presente?

- a. edemi
- b. ipotrofia muscolare**
- c. anemia
- d. dislipidemia
- e. proteinuria

55. La terapia desensibilizzante per l'asma:

- a. da somministrare solo con personale qualificato capace di gestire una reazione allergica
- b. è una alternativa alla terapia farmacologica
- c. si utilizza per il pz instabile, di grado severo e che non risponde al trattamento**
- d.
- e. si utilizza nelle prime fasi, in pz con asma lieve

56. La causa principale di diabete insipido è:

- a. tumore ipotalamo**
- b.
- c.
- d.
- e.

57. Un indice ABI tra 1 e 1,2 è considerato:

- a. normale**
- b. alto
- c. basso
- d. segno di moderata arteriopatia
- e.

58. Nella lombalgia senza irradiazione agli arti inferiori è indicato eseguire RX dopo:

- a. 10 giorni
- b. 45 giorni
- c. 4 settimane**
- d. non c'è indicazione
- e. 48 ore

59. Una tac a quante rx torace corrisponde come radiazioni?

- a. 10 volte
- b. 100 volte
- c. 200 volte**
- d. 400 volte
- e. 700 volte

60. Associazioni farmaci sconsigliata in Ipert art:

- a. acei+sartani+betabloccanti**
- b. sartani+betablocc+calcio antag
- c. beta blocc+ace i+diuretici tiazidici
- d. beta blocc+ace i+ diuretici ansa
- e.

61. Controindicazione assoluta NAO:

- a. gravidanza**
- b. IRC terzo
- c. IRC secondo
- d. IRC primo
- e.

62. Le varici esofagee compaiono a che gradiente pressorio?

- a. 7-9
- b. 10-14**
- c. 4-6
- d. 19-22
- e. 15-18

63. Qual è il calcolo renale radiotrasparente?

- a. acido urico
- b. carbonato di calcio
- c. fosforo
- d. colesterinico
- e. ossalato di calcio

64. Esecuzione prove di funzionalità respiratoria, in quale caso in cui non è controindicato?

- a. Gravidanza III trimestre
- b. Cifoscoliosi grave
- c. emottisi
- d. nausea e vomito
- e. addome acuto

65. Il sotalolo si usa nelle

- a. tachiaritmie VENTRICOLARI
- b. trombosi della mesenterica
- c. prevenzione primaria fibrillazione atriale
- d. blocchi AV
- e.

66. L'alfa glucosidasi è:

- a. un enzima che agisce sul metabolismo glucidico
- b. un antiaggregante
- c. un diuretico
- d.
- e.

67. Pazienti entrambi in nao chi ha rischio maggiore di sviluppare ictus uomo o donna?

- a. uguale
- b. donna
- c. uomo
- d. dipende dalla familiarità
- e. Dipende dallo stato nutrizionale

68. Paziente in ambulatorio dimagrimento 8kg in due mesi astenia e difficoltà alla deglutizione primo esame diagnostico da eseguire:

- a. Egds
- b. Eco addome
- c. TC torace
- d. sangue occulto nelle feci
- e.

69. Paziente con familiarità patologia cardiovascolare e diabetica in ambulatorio per riscontro ipertensione 155/90 Con conferma a holter pressorio.funzionre renale/epatica normale. Quale passo successivo non è indicato:

- a. prescrivere atorvastatina 80mg ogni 12h
- b. prescrivere ramipril
- c. eco addome per studio grandi vasi
- d. consigliare riduzione apporto sale nella dieta
- e.

70. A cosa sono associate le disfunzioni tiroidee nell'anziano?

- a. osteoporosi
- b. ipocorticosurrenalismo
- c. infarto miocardio
- d. artrite reumatoide
- e. scompenso cardiaco

71. Pz con disuria, senza lombalgia o perdite vaginali

- a. IVU non complicata
- b. vaginite
- c. pielonefrite
- d.
- e.

72. Quale antibiotico non si associa alle statine per rischio miopatia?

- a. claritromicina**
- b. imipenem
- c. amoxi
- d. amoxi-clavulanato
- e. ampicillina

73. Quale antibiotico non agisce sulla parete batterica:

- a. claritromicina**
- b. amoxicillina
- c. vancomicina
- d.
- e.

74. Strategia OMS per carenza iodio

- a. misurare ioduria in gravidanza
- b. misurare ioduria nel neonato
- c. introdurre sale iodato**
- d.
- e.

75. Cos'è il toxoplasma?

- a. protozoo**
- b. gram negativo
- c. virus
- d. micete
- e. gram positivo

76. All'ECG a 12 derivazioni quali sono le differenze uomo-donna?

- a. QT più lungo**
- b. nessuna
- c. onda P
- d. qrs
- e. Punto j
- f. tratto ST

77. Antistaminico di seconda generazione:

- a. cetirizina
- b. promazina
- c.
- d.
- e.

78. La pellagra è deficit di

- a. b3
- b. b6
- c. b12
- d. b1
- e. b2

79. Tumore ai polmoni è più frequente:

- a. nei soggetti di estrazione alta
- b. nei soggetti di estrazione bassa**
- c. tra i 35 e 45 anni
- d. nelle donne
- e.

80. Il tumore più frequente nelle donne è:

- a. mammella**
- b. ovaio
- c. utero
- d.
- e.

81. Ipersodiemia a valori maggiori di:

- a. 110
- b. 125
- c. 135
- d. 145**
- e.

82. Non è un fdr per NASH:

- a. calcolosi colecisti
- b. obesità
- c. ipercolesterolemia
- d. ipertrigliceridemia
- e. snd metabolica

83. Nel diabete stabile ogni quanto si dosa l'emoglobina glicata?

- a. ogni 6 mesi
- b. ogni 2 anni
- c.
- d.
- e.

84. Il test di reversibilità dell'asma:

- a. 12%, 200ml
- b. 20% 300 ml
- c. 18%
- d. 15%
- e. 10%

85. Quando è preferibile warfarin del NAO?

- a. valvola meccanica
- b. valvola biologica ed FA
- c. FA non valvolare ma con GFR tra 30 e 60
- d.
- e.

86. Quando si parla di malattia renale cronica?

- a. danno morfologico e funzionale per 6 mesi
- b. riduzione VFG<60 per almeno 3 mesi + marcatore di danno d'organo
- c.
- d.
- e.

87. Pz con carenza di ferro ma non anemia, quando iniziare il supplemento?

- a. IRC
- b. Scompenso cardiaco
- c. pz oncologico
- d. ipertiroidismo
- e.

88. nella snd iper reninemia iperaldosteronismo e ioni alterati è:

- a. snd bartter
- b. snd laron
- c. snd turcot
- d. snd Kawasaki
- e.

89. Quale azione non è raccomandata nel follow-up domiciliare dello scompenso cardiaco cronico?

- a. rotazione del diuretico
- b. monitoraggio sistematico del peso
- c. diuresi 24h
- d. valutazione pro bnp
- e. restrizione liquidi

90. Quale è falsa sul dabigatran?

- a. monitorare INR prima di chirurgia orale
- b. aumenta il rischio di sanguinamenti GI
- c.
- d.
- e.

91. Quale non è una raccomandazione nella terapia per diabete tipo 1 e 2:

- a. non si consiglia dieta con riduzione di carboidrati
- b. attività fisica e restrizione calorica
- c. sopra 40 di bmi considerare come prima scelta la chirurgia bariatrica
- d. anche se a basso rischio, far fare sempre test da sforzo a chi volesse intraprendere attività fisica
- e.

92. Quali di questi farmaci è nocivo per la tiroide?

- a. amiodarone
- b. digossina
- c.
- d.
- e.

93. Donna in terapia con levotiroxina con TSH 3,5 desiderosa di avere una gravidanza, cosa consigliare?

- a. aumento dosaggio eutirox e controllo dopo 4 settimane
- b. diminuire dosaggio
- c. eseguire controllo ematochimici e tranquillizzare la paziente
- d. Effettuare una ecografia d'urgenza, effettuare un esame di laboratorio per confermare il valore di TSH e tranquillizzare la paziente
- e. Somministrare acido folico

94. Cosa non c'è nell'ipertensione portale?

- a. calcoli colecisti
- b. ascite
- c. varici esofagee
- d. varici rettali
- e.

95. Cosa è tipico nell'esame urine delle IVU non complicate?

- a. Batteriuria
- b.
- c.
- d.
- e.

96. Qual è l'agente più frequente nelle IVU non complicate?

- a. E. Coli
- b.
- c.
- d.
- e.

97. Fattori rischio cardiovascolare

- a. Pressione sistolica, diabete, età, tabagismo, ipercolesterolemia
- b.
- c.
- d.
- e.

98. Quale non rientra tra i fattori di rischio cardiovascolare nel progetto Cuore dell'ISS (qualcosa del genere?):

- a. familiarità
- b. colesterolo
- c. sindrome metabolica?
- d.
- e.

99. FA differenze uomo-donna:

- a. Il risultato dell'intervento di ablazione chirurgica è uguale in uomo e donna
- b. Prevalenza di FA maggiore nella donna che nell'uomo
- c.
- d.
- e.

100. Vantaggi dei NAO rispetto a warfarin:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

